

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.*
- *Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.*
- *Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.*
- *Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.*
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur, prévenir l'équipe médicale.*

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséeux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

Protocole CAELYX

Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole CAELYX®

Ce médicament pourra être prescrit seul ou en association avec un autre produit

Caelyx® est administré par voie intraveineuse sur 1h
(1h30 lors de la première perfusion)
à raison d'une fois toutes les 4 semaines



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique. **Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.** Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réactions allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons, sensation de malaise, rougeurs. • Syndrome main-pied : sécheresse de la peau et rougeur des mains et des pieds. Douleurs dans les mains et les pieds. • Stomatite, mucite : aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres. • Anorexie. • Nausées, vomissements. • Alopécie (chute des cheveux). 	<ul style="list-style-type: none"> • Des médicaments anti-allergiques seront administrés avant l'injection. • Eviter toute exposition des mains et des pieds à la chaleur, et toute compression des extrémités (gants, chaussures trop serrées...). Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum. • Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac. • Prendre plusieurs petites collations par jour. Manger lentement, boire beaucoup. • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas. • Pas de soin agressif type teinture ou permanente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prévenir rapidement le médecin ou l'infirmière. • En parler au médecin ou à l'infirmière. • Prévenir le médecin qui pourra prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale. • Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique. Demander les conseils d'une diététicienne. • Si les vomissements ont lieu moins d'une heure après la prise des comprimés (sauf lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs abdominales, constipation, diarrhée. • Neutropénie, pharyngite, signes généraux d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang. • Paresthésies : engourdissement ou fourmillement dans les doigts et les orteils, troubles de la vue ou de l'ouïe, difficulté à marcher. • Peau sèche, pigmentation anormale, érythème. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eviter les aliments épicés et frits. Prévenir la constipation en buvant beaucoup et en ayant une alimentation riche en fibres. • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boire beaucoup d'eau. Prévenir le médecin si les signes persistent plus de 48h. • Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C ; un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire. • Le signaler au médecin. • En parler à votre médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.