

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- Evitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.
- Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur, prévenir l'équipe médicale.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséeux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

Protocole CARBOPLATINE FU ERBITUX

Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole CARBOPLATINE-5FU-ERBITUX

Ce protocole comprend l'administration de 3 médicaments :

CARBOPLATINE

administré sur 1 jour en perfusion de 1 h toutes les 3 semaines

5-Fluoro-Uracile

en perfusion continue de 96 h à votre domicile toutes les 3 semaines

ERBITUX® (Cétuximab)

administré toutes les semaines en perfusion de 2 heures.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.

Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.

Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **CARBOPLATINE-5FU-ERBITUX**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nausées et vomissements. • Réactions allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons, sensations de malaise, rougeurs. • Réaction cutanée type acné sur le visage, les épaules ou le tronc. • Saignements inhabituels, hématomes, pétéchies (taches rouges sur la peau), selles noires, liés à la baisse du nombre de plaquettes dans le sang. • Mucite, stomatite : aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres. • Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, liés à la diminution du nombre de globules blancs dans le sang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements. Manger lentement et fractionner les repas. Eviter les aliments gras, frits et épicés. • Des médicaments anti-allergiques seront administrés avant l'injection. • Protection contre le soleil (écran total), hydratation de la peau. • Attention aux coupures et blessures, utiliser une brosse à dents souple, ne pas utiliser de thermomètre rectal. • Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac. • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si les vomissements ont lieu moins de une heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Prévenir rapidement le médecin ou l'infirmière. • Réaction réversible à l'arrêt du traitement, le médecin pourra prescrire un traitement spécifique. • En cas de saignement, exercer une pression ferme pendant 10 à 15 minutes. Avertir le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes. • Faire systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction d'autres produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenir le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie). • Contrôlez votre température et prévenir immédiatement votre médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin et éventuellement une prescription d'antibiotiques seront effectués. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Troubles de la fonction rénale. • Douleurs et rougeurs dans les mains et les pieds (syndrome main-pied). • Diarrhées. • Engourdissements ou fourmillements dans les doigts et les orteils. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bien boire après la séance. • Eviter de rester trop longtemps debout et de porter des chaussures serrées. Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum. • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin surveillera votre fonction rénale et pourra adapter les doses. • En parler au médecin ou à l'infirmière. • Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin. • Contacter rapidement le médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.