

# Recommandations générales

## ● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

## ● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

## ● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

## ● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.*
- *Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.*
- *Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.*
- *Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.*
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur prévenir l'équipe médicale.*

## ● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin. Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséeux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

## ● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

# Protocole CISPLATINE-TAXOTERE

## Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole CISPLATINE-TAXOTERE®

Ce protocole comprend l'administration de 2 médicaments :

Cisplatine  
une injection par jour pendant 1 à 3 jours  
TAXOTERE® (Docetaxel)  
une injection le premier jour

Cette cure sera répétée tous les 21 jours.  
Ces médicaments seront administrés en perfusion intraveineuse.  
La durée de l'administration sera de 2 heures.



pour la vie



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique. **Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.** Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

## Protocole CISPLATINE-TAXOTERE

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p><b>Fréquents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse du nombre de globules blancs dans le sang.</li> <li>• Nausées et vomissements.</li> <li>• Troubles de la fonction rénale.</li> <li>• Anomalies de l'audition, bourdonnements d'oreilles.</li> <li>• Engourdissements ou fourmillements dans les doigts et les orteils.</li> <li>• Pigmentation des ongles (coloration jaune orange) et altération des ongles (décollement).</li> <li>• Alopécie (chute des cheveux).</li> <li>• Douleurs musculaires et articulaires.</li> <li>• Réactions cutanées au niveau des pieds et des mains.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.</li> <li>• Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas ; éviter les aliments gras, épicés et frits.</li> <li>• Boire beaucoup d'eau après la séance.</li> <li>• Des moufles réfrigérantes pourront vous être proposées ; vous pouvez mettre du vernis de couleur foncée (anti-UV) sur les ongles des mains et des pieds et le renouveler pendant le traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement.</li> <li>• Un casque réfrigérant pourra être proposé pour limiter cet effet s'il n'y a pas de contre-indication. Pas de soin agressif type teinture ou permanente.</li> <li>• Utiliser des crèmes hydratantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C ; un bilan sanguin sera effectué, et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.</li> <li>• Si les vomissements ont lieu moins de 1 heure après la prise des comprimés (sauf lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin.</li> <li>• Votre médecin surveillera votre fonction rénale et pourra adapter les doses.</li> <li>• Contacter rapidement le médecin.</li> <li>• Contacter rapidement le médecin.</li> <li>• En parler à votre médecin qui pourra prescrire un traitement adapté.</li> <li>• Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.</li> <li>• En parler au médecin qui pourra prescrire un antalgique.</li> </ul>
<p><b>Moins fréquents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saignements inhabituels, hématomes, pétéchies (taches rouges sur la peau), selles noires, liés à la baisse du nombre de plaquettes dans le sang.</li> <li>• Rétention d'eau dans les bras et les jambes.</li> <li>• Réactions allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons, malaise, rougeurs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attention aux coupures et blessures. Utiliser une brosse à dents souple. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.</li> <li>• Des médicaments anti-allergiques seront administrés avant l'injection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de saignement, exercer une pression ferme pendant 10 à 15 minutes. Avertir le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes.</li> <li>• En parler à votre médecin.</li> <li>• Contacter rapidement le médecin.</li> </ul>

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**