

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenir votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. En parler à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Si vous fumez, en parler à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- Eviter de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- Une diminution de l'appétit peut survenir. Il faut manger plus souvent mais en petites quantités à la fois.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne pas prendre de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou des produits à base de millepertuis) sans en parler avec votre médecin. **Ne pas boire de jus de pampleousse, qui peut interagir avec le TORISEL.**

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement.

Si vous oubliez une prise, ne pas doubler la dose suivante. Poursuivre le traitement normalement et en informer votre médecin.

Protocole TORISEL

**Vous allez suivre un traitement
par thérapie ciblée, à raison d'une injection
toutes les semaines.
La durée de l'administration
sera d'une heure.**



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminution de l'appétit et fatigue. • Augmentation des taux de glucose, de cholestérol et de triglycérides sanguins. • Infections pulmonaires (essoufflement, toux, fièvre) • Oedèmes • Réactions allergiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre plusieurs petites collations par jour. Manger lentement, boire beaucoup. • Un bilan sanguin (glucose, cholestérol...) sera effectué avant et pendant le traitement. • Des médicaments antiallergiques seront administrés avant l'injection. 	<ul style="list-style-type: none"> • Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique. Demander les conseils d'une diététicienne. Se reposer souvent. • Une soif excessive et/ou une envie fréquente d'uriner doivent être signalées au médecin. Des médicaments hypoglycémifiants ou hypolipémiants peuvent être prescrits. • Prévenir rapidement le médecin. • Prévenir rapidement le médecin ou l'infirmière.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, liés à la diminution du nombre de globules blancs dans le sang. • Troubles de la fonction rénale. • Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres. • Réaction cutanée type acné sur le visage, les épaules ou le tronc ; sécheresse cutanée 	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. • Bien boire après la séance. • Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple, éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés ou acides, l'alcool et le tabac. • Protection contre le soleil (écran total). 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler votre température et prévenir immédiatement votre médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation peut être nécessaire. • Votre médecin surveillera votre fonction rénale et pourra adapter les doses. • Prévenir le médecin qui pourra prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale. • Réaction réversible à l'arrêt du traitement, consulter l'équipe médicale.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.