

Commission des Anti-Infectieux DU 19 JANVIER 2023

AB ANTI-STAPHYLOCOCCIQUES :

1. Exposé des résistances des Staph sur 2022. F. Robin



Pourcentages de R
en 2022 v2.pptx

2. Exposé des conso d'antibios selon Consores. C. Chatron

➔ A interpréter avec précaution mais identifie les services les plus prescripteurs pour dapto, dalba...

Dapto : chir ortho (protocole), chir vasc (protocole), réa médicale



Bilan Conso CU
Clermont anti staph

Stratégie d'usage des anti-SARM :

➔ Dapto et vanco au même niveau : pas de restriction de prescription de la dapto (hors contre-indications connues : pneumopathie primitive à SARM, infection SNC)

Courant mai : il n'y aura plus d'ordonnance nominative pour la daptomycine. Ordonnance aux indications désuètes.

Pas de restriction de prescription de la dapto mais travail sur le bon usage de cet antibiotique :

♥ Pour l'orthopédie : nécessité de limiter la prescription de dapto dans des durées de prescription raisonnables (réévaluation à J7 systématique et ne pas attendre J14) : mise à jour du Bon usage des infections ostéo-articulaires sur matériel et diffusion de document.

♥ Travail avec la réa médicale.

♥ Audit Prescription de la dapto avec le CRATB. C. Theïs.

Sur la conso ARA, le CHU de Cl-Fd est dans les « normes » plutôt basse en terme de quantité de dapto prescrite (exprimée en DDJ/1000JH).



Conso_Dapto_ARA_
parES.docx



Protocole et
Rapport audit pertir

- ♥ Pour la dalbavancine : CHU Clermont-Fd a des prescriptions importantes de Dalba → retour à faire sur cette expérience : C. Theïs.

Anti SAMS : céfazo vs oxa → plus d'IRA avec Oxa ? → biblio à faire

Bon Usage bactériémies à SAMS à finaliser ++++ : M. Vidal, F.Anglade, L. Olagne, C.Richaud



BU Bactériémie
SA.pdf

POINT SUR LES PENURIES D'AB : RUPTURE DE STOCK AVEREE EN LEVOFLOXACINE.

Mail à liste med le 19.01.2023 :

Bonjour à tous,

L'amoxicilline et l'amoxicilline –acide-clavulanique sont toujours en pénurie mais les difficultés à obtenir ces molécules en ville semblent être actuellement peu importantes (stocks probables dans les pharmacies de ville).

Ces molécules sont disponibles sans problème à l'hôpital.

En revanche : rupture de stock avérée en ville et à l'hôpital en LEVOFLOXACINE.

Pour les infections ostéo-articulaires à staphylocoques traitées par Lévofoxacine-Rifampicine :

vous pouvez remplacer la Lévofoxacine par de la CIPROFLOXACINE 500 mg matin et soir (à adapter à la fonction rénale).

Pour les autres indications, si problématique de choix de molécule alternative, vous pouvez joindre l'avis infectieux : avis.infectieux@chu-clermontferrand.fr

Antibiotiquement vôtre...