

FENTE LABIALE ET PALATINE



DESCRIPTION

Les fentes labiales et/ou palatines sont une malformation de la face qui consiste en une ouverture de la lèvre supérieure pouvant se prolonger jusqu'au voile. La fente peut toucher un seul côté de la lèvre, les 2 côtés ou exceptionnellement être centrale. Les fentes labiales sont fréquemment diagnostiquées lors de l'échographie morphologique, alors que les fentes palatines ne sont pas facilement visibles à l'échographie.

Cette anomalie se divise en 4 types :

- La fente labiale unilatérale sans atteinte du palais et/ou du voile ;
- La fente labiale unilatérale avec atteinte du palais et/ou du voile ;
- La fente labiale bilatérale avec ou sans atteinte du palais et/ou du voile ;

- La séquence de Pierre Robin (*associant glossoptose, microrétrognathie et fente palato-vélaire*) qui peut s'accompagner d'un hydramnios.

Cette anomalie, présente chez 1 **individu sur 1000** au sein de la population caucasienne, est plus répandue parmi les individus d'origine orientale (**1 grossesse sur 600**) et également plus rare chez les personnes d'origine africaine (**1 grossesse sur 2500**).

La majorité des enfants porteurs de fentes labiales ou labiopalatines ne présentent pas de syndrome, mais un conseil génétique est tout de même recommandé.

CAUSES

Les causes de la fente labiale et/ou palatine sont multifactorielles. Des facteurs extérieurs tels que la prise de certains médicaments, la prise d'alcool et la carence en acide folique ont été rapportés. L'incidence est plus élevée lorsqu'un membre de la famille est porteur d'une fente. Cette malformation peut être associée à un syndrome chez 10 à 15 % des enfants.

SYMPTÔMES À SURVEILLER

Lors d'un diagnostic de fente labio-palato-vélaire, il y a un faible risque de développer un polyhydramnios. Ceci est caractérisé par une augmentation du liquide amniotique.

TESTS ET PROCÉDURES

Un suivi échographique au troisième trimestre, ou selon l'évolution clinique, est recommandé pour surveiller le niveau de liquide amniotique.

Une consultation avec l'équipe de chirurgie

maxillo-faciale est réalisée en cours de grossesse afin de mieux comprendre la malformation, de discuter de l'alimentation du bébé à la naissance en tenant compte de la présence ou non d'une fente palatine et des chirurgies correctrices qui seront réalisées.

TRAITEMENTS ET SUIVIS

L'évaluation de la mère et du bébé à venir est faite par une équipe multidisciplinaire comprenant un obstétricien spécialisé en médecine foetomaternelle et un chirurgien maxil-

lo-facial. Plusieurs autres professionnels (un psychologue, par exemple) peuvent également faire partie de l'équipe selon les besoins individuels.


À la suite du diagnostic de fente labiale ou labiopalatine, un conseil génétique est recommandé afin d'évaluer le risque d'anomalies chromosomiques ou génétiques de cause syndromique.

Il est possible qu'une amniocentèse soit recommandée, selon le diagnostic établi.



Le suivi de grossesse ainsi que l'accouchement peuvent se faire dans n'importe quel milieu hospitalier, à moins d'avis contraire de

la part des spécialistes au cours du suivi de grossesse. L'accouchement d'un enfant porteur d'une fente labiale ou labiopalatine ne cause pas de problème particulier. Ces enfants n'ont pas de difficultés respiratoires et les réflexes de succion et de déglutition sont normaux. Cependant, lorsque le palais est ouvert, la capacité de succion est déficiente. On devra donc adapter le biberon pour pallier le manque de succion. Lorsque le palais est intact, la succion est normale et l'allaitement se fait habituellement sans difficulté.



Voici quelques photos illustrant différentes fentes labiales avant et après la chirurgie :





Fente labiale isolée




Fente labio-alvéolaire




Fente labio-palato-vélaire



Fente labiale bilatérale





Fente labiale et palatine **Unité de Diagnostic AnteNatal**

Pôle Femme et Enfant
Site Estaing
1 place Lucie et Raymond Aubrac
63000 Clermont Ferrand