

Bon
Commun

version 11 GLIMS

PRA GM : 51 844

PRA HE : 50 686

(Secrétariat service Préanalytique)



CHU CLERMONT-FERRAND
CENTRE HEPATOLOGUE UNIVERSITAIRE

N°SEJOUR

NOM ETIQUETTE PATIENT

PRENOM

ETIQUETTE
UF

RESERVE AU
LABORATOIRE

Reservé au
laboratoire

Nom du prescripteur :

Nom du préleveur :

DATE

HEURE

☐ URGENT

Réservé CDP/CRB :

☐ CDP HE

☒ CDP GM

☐ CRB

☐ PAS de mail CDP

☐ Cirrhose

☐ Grossesse

☐ Sepsis

☐ Syndrome méningé

☐ Immunodépression

☐ Anémie hémolytique

☐ Diabète

☐ GEU

☐ Syndrome néphrotique

☐ Post transfusion

☐ Insuffisance rénale

☐ Confidentialité demandée
(aucun compte rendu patient)

☐ GARDE Réserve au laboratoire

☐ Insuffisance hépatocellulaire

☐ Renseignements cliniques :

HEMATOLOGIE

HEMATOLOGIE GENERALE

TRAITEMENT(S) ANTICOAGULANT(S) A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

☐ Héparine Non Fractionnée SC

☐ Danaparoïde (Orgaran)

☐ Apixaban (Eliquis)

☐ Héparine Non Fractionnée IV

☐ Argatroban (Arganova)

☐ Edoxaban (Lixiana)

☐ HBPM Nom :

☐ Rivaroxaban (Xarelto)

☐ Dabigatran (Pradaxa)

☐ Fondaparinux (Arixtra)

☐ Autres :

Date et Heure d'administration : H

Posologie :

☐ Pas de traitement anticoagulant

☐ AVK

HEMOSTASE GENERALE

☐ Bilan coagulation (TP, TCA, Fib)

☐ Bilan Pré-op (TP, TCK, Fib)

☐ TP (INR)

☐ Facteurs du TP (II, V, X)

☐ TCA

☐ Fibrinogène

☐ Facteur V

☐ TCK

☐ D-Dimères

☐ Facteur VII

☐ Antithrombine

☐ Monomères fibrine

☐ Anti-Xa (Héparines : HNF, HBPM)

☐ Autres :

Microméthode

☐ Veineux

☐ Capillaire

CYTOLOGIE

☐ Numération Formule Sanguine

☐ Numération Globulaire seule

☐ Réticulocytes

☐ Hématocrite seul

☐ Plaquettes seules

☐ Vitesse de sédimentation

☐ Recherche de cellules anormales

Préciser :

☐ Sur

Microméthode

☐ Plaquettes sur sang citraté

CYTOLOGIE SPECIALISEE

LIQUIDES

☐ LCR (Recherche de cellules anormales)

KLEIHAUER

☐ Test de Kleihauer sur sang maternel

DOSAGES SPECIFIQUES

☐ Anti-Xa Rivaroxaban (Xarelto)

☐ Anti-Xa Apixaban (Eliquis)

☐ Anti-IIa Argatroban (Arganova)

☐ Anti-Xa Danaparoïde (Orgaran)

☐ Anti-Xa Fondaparinux (Arixtra)

☐ Anti-IIa Dabigatran (Pradaxa)

HEMOSTASE SPECIALISEE

FACTEURS

Etude complète (4 tubes) cocher : Facteurs VIII, IX, XI, XII

☐ FAH :

☐ Facteur VIII

☐ Facteur IX

☐ Facteur XI

☐ Facteur XII

☐ Facteur Von Willebrand (activité et antigène) Groupe sanguin :

Bilan thrombose (8 tubes) : cocher toutes les cases du cadre

☐ Lupus anticoagulant, Ac anti-cardiolipides, Ac anti Beta2GP1

☐ Facteur VIII

☐ Protéine C

☐ Protéine S

☐ Antithrombine

☐ Résistance à la Protéine C Activée

NUMERATION DES SOUS POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES NORMALES

Typage sur sang ☐ Numération CD4-CD8 seul

☐ Typage lymphocytaire T, B, NK

☐ Typage lymphocytaire CD158k

☐ Typage CD20

Préciser les traitements immuno-modulateurs :

VIROLOGIE

Contactez impérativement un biologiste de virologie ou l'interne de garde en dehors des heures d'ouverture du service de virologie.

☐ AES - PATIENT SOURCE 2 ●

Joindre la fiche de renseignements "AES serologies virales du patient source" disponible dans le catalogue des examens biologiques. Prélever 2 tubes secs avec gel séparateur.

TOXICOLOGIE

Recherche:

☐ Antidépresseurs Tricycliques

☐ Barbituriques

☐ Benzodiazépines

Dosages:

☐ Lithium Sérique

☐ Paracétamol

Prélèvement réalisé

heures après la prise.

Reservé laboratoire

☐ Non conformité bloquante.....

☐ Scan Ordo

☐ Tube surmuméraire

☐ Autre analyse

☐ Date/heure fausse

☐ mauvais conditionnement.....

☐ Case non/mal cochée

☐ Absence rens cliniques

☐ Navette

☐ Echantillon microbio

☐ Convenance perso.

☐

☐ Protocole

☐ Absence de traitement

☒ Cocher impérativement dans la case
PAS DE FEUTRE

- Echantillon à l'abri de la lumière
- ❄ Echantillon dans système réfrigéré
- Transport < 1 H

Examen souligné = tube dédié

Abréviations :

- * PDCI : Prise de produit de contraste iodé
- * ACM : Anticorps monoclonal

RESERVE AU
LABORATOIRE



BIOCHIMIE

- | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Microméthode | ☐ Prise de biotine | ☐ Avant dialyse | ☐ | ☐ QFAF HEP | ☐ PAHEP |
| ☐ Lithiase urinaire | ☐ Après dialyse | ☐ | ☐ | ☐ QFAF SEC | |

EXAMENS SANGUINS

- | | |
|--|---|
| ION ☐ Na + K + Cl | BF ☐ Coefficient de saturation
(Fer - transferrine) |
| IONO ☐ Ions + CO ₂ + Protéines + TA | ☐ Ferritine |
| ☐ IONO + Créatinine | PINI ☐ Calcul du PINI
(OROSOMUCOÏDE x CRP) / (PAB x ALB) |
| ☐ Créatinine + CKDEPI | ☐ Préalbumine |
| ☐ Calcium ☐ Sodium | ☐ Albumine |
| ☐ Glucose ☐ Potassium | ☐ Haptoglobine |
| ☐ Urée ☐ CO ₂ total | ☐ CRP |
| ☐ Protéines | ☐ Procalcitonine |
| ☐ Ac. urique ☐ Alcool non médico légal | ☒ Lactate |
| ☐ Magnésium ☐ Osmo. mesurée | ☒ Ammoniémie |
| ☐ Phosphore ☐ Bilirubine totale | ☐ Art ☐ Vein ☐ Capil |
| BHEP ☐ ASAT + ALAT + GGT + PAL | ☐ Electro. protéines ELPRO |
| ☐ ASAT | ☐ PDCI* ☐ ACM* |
| ☐ ALAT | ☐ TSH |
| ☐ CPK | ☐ T4 libre |
| ☐ LDH | ☐ T3 libre |
| ☐ Lipase | ☐ DDR :/...../..... |
| ☐ Troponine Ic | ☐ hCG grossesse |
| ☐ Myoglobine | ☐ hCG marqueur tumoral |
| ☐ NT-pro-BNP | ☐ Cortisol |
| EAL ☐ Exploration anomalie lipidique | ☐ Protéine S100B |
| ☐ Hémoglobine glyquée | ● ☐ Vitamine B12 |
| Type de diabète: | ● ☐ Folate sérique (Vit. B9) |

EXAMENS URINAIRES

- ☐ Miction
- OU
- Diurèse des 24h
- ☐ Taille.....cm
- ☐ Poids.....kg
- ☐ Clairance à la créatinine (sang et urines de 24h)
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Na K Cl | ☐ Acide urique |
| ☐ Urée | ☐ Phosphore |
| ☐ Créatinine | ☐ Albumine |
| ☐ Protéines | ☐ Magnésium |
| ☐ Glucose | ☐ Osmolalité |
| ☐ Calcium | |

EXAMENS LIQUIDE CEPHALO RACHIDIEN

- ☐ Cl Prot Glu
- Laboratoire: aspect avant centrifugation
- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ CLAIR | ☐ HEMORRAGIQUE |
| ☐ TROUBLE | ☐ XANTHO |

BACTERIOLOGIE / MYCOLOGIE / PARASITOLOGIE

- Renseignements cliniques : ☐ Fièvre ☐ Purpura ☐ Pvt visée diagnostique ☐ Pvt systématique
- Traitement antibiotique: ☐ non ☐ oui:

HEMOCULTURE

endocardite ☐

- | | Couple
hémocultures | Flacon
pédiatrique | Flacon
fongique |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Périphérique | ☐ | ☐ | ☐ |
| KT Central | ☐ | ☐ | ☐ |
| KT Artériel | ☐ | ☐ | ☐ |
| KT Dialyse | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ch. implantable | ☐ | ☐ | ☐ |
| PICC line | ☐ | ☐ | ☐ |

ECBU

- | | |
|---|---|
| pyélonéphrite ☐ | cystite ☐ |
| ☐ sans sondage | ☐ sonde à demeure |
| ☐ sondage aller-retour | ☐ sonde urétérale gauche |
| ☐ Bricker | ☐ sonde urétérale droite |
| ☐ cystocath | ☐ cytologie seule |
| ☐ autre : | |

ANTIGENES URINAIRES (Pneumopathies)

- ☐ legionelle ☐ pneumocoque

LIQUIDE CEPHALO RACHIDIEN

- méningite ☐ PL thérapeutique ☐ encéphalite ☐
- ☐ ponction lombaire ☐ drainage ☐ + recherche mycologique (dont Cryptocoque)

PALUDISME

☐ Sang EDTA

- Prophylaxie ☐ oui ☐ non ☐ Retour de (pays ou région) : Départ : / / Retour : / /
- Signes cliniques, radiologiques, renseignements :