

Sérologie infectieuse

Bactériologie
04.73.75.17.91
Mycologie-Parasitologie
Virologie
04.73.75.48.50



CLERMONT-FERRAND
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

N°SEJOUR

NOM ETIQUETTE PATIENT

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ETIQUETTE

U F

RESERVE AU
LABORATOIRE

Nom du prescripteur :

Nom du préleveur :

Réservé au
laboratoire

DATE

HEURE

☐ URGENT

Réservé CDP/CRB :

☐ CDP HE

☐ CDP GM

☐ CRB

☐ PAS de mail CDP

☐ GARDE

Réservé au laboratoire

Renseignements cliniques

- ☐ Suivi d'infection chronique ☐ Transplantation ☐ Immunodépression (préciser) :
- Pré-greffe : ☐ organes ☐ moelle osseuse
- ☐ Voyage Date de retour : Lieu :
- ☐ Grossesse :SA ou date de début de grossesse : ☐ Suspicion d'IMF

Signes cliniques :

- Date début signes cliniques :
- ☐ Fièvre ☐ Eruption généralisée ☐ Encéphalite ☐ Péricardite ☐ Contrôle vaccinal
- ☐ Adénopathies ☐ Eruption localisée ☐ Guillain-Barré ☐ Myocardite ☐ Polytransfusion
- ☐ Sd pseudo-grippal ☐ Ulcérations ☐ Paralyse (préciser) : ☐ Cytolyse hépatique ☐ Prétransfusionnel
- ☐ Vésicules
- ☐ Autres signes cliniques :

Bilans standardisés

(inutile de cocher le détail des examens demandés dans ces bilans)

- ☐ AES : VICTIME (J0) 1 ☐ AMP routine 2
- DONS :** ☐ lait 1 ☐ MO donneur potentiel 2 ☐ MO donneur recruté 2 4 1 ☐ cornées 2 3
- ☐ gamètes (séro J0) 2 4 1 ☐ gamètes (CV) 3 ☐ thérapie cellulaire (D=R) 2 ☐ pré-allogreffe (receveur) 4

EXAMENS URGENTS Contacter impérativement un biologiste de virologie ou l'interne de garde en dehors des heures d'ouverture du service

- ☐ AES : SOURCE 1 ☐ Don d'organes (PMO) 3 4 1 ☐ Ag HBs accouchement 1 ☐ Hépatite fulminante 4 2 ☐ Cardiopathie à risque vital 4 1

Virologie

Détermination du statut immunitaire = recherche d'IgG (G). Diagnostic d'une infection aiguë / récente = recherche d'IgG et d'IgM (G+M)
Prélever 1 tube sec avec gel séparateur 7 mL. Quel que soit le nombre de sérologies prescrites.

VIH 1 et 2

- ☐ Dépistage (recherche combinée
Ac anti-VIH-1 et VIH-2 et Ag p24)

VHC : Hépatite C

- ☐ Dépistage (Ac)

VHB : Hépatite B

- ☐ Dépistage (AgHBs, AcHBs, AcHBc)
☐ Dépistage grossesse (AgHBs)
☐ Contrôle après vaccination (AcHBs)
☐ Suivi VHB chronique (AgHBs, AgHBe, AcHBe)
☐ Contrôle de guérison (AgHBs, AcHBs)
☐ Autre (préciser) :

VHA : Hépatite A

- ☐ Statut immunitaire (G) ☐ Infection aiguë (M)

HTLV 1 et 2

- ☐ HTLV 1 et 2 (dépistage ou contrôle)

SARS-CoV-2 : COVID-19

- ☐ Statut immunitaire / vaccinal (G)

VIH 1 et 2

- ☐ Ag p24 (suspicion primo-infection)
☐ Contrôle suite à un dépistage positif
Recherche combinée Ac anti VIH-1 et VIH-2 et Ag p24
sur un 2nd prélèvement.

Rubéole

- ☐ Statut immunitaire (G)
☐ Infection aiguë (G + M)

VHE : Hépatite E

- ☐ Infection aiguë (M)

Examens transmis

- ☐ Polio : contrôle vaccinal
☐ Arboviroses ☐
☐ Hantavirus ☐
☐ VHD : Hépatite Delta (G)

☐ Fiche de renseignements obligatoire

CMV : Cytomégalo virus

- ☐ Statut immunitaire (G) ☐ Infection aiguë (G + M)

EBV : Virus Epstein-Barr

- ☐ Statut immunitaire (G) ☐ Infection aiguë (G + M)

Parvovirus B19

- ☐ Statut immunitaire (G) ☐ Infection aiguë (G + M)

Oreillons

- ☐ Statut immunitaire (G) ☐ Infection aiguë (G + M)

Rougeole

- ☐ Statut immunitaire (G) ☐ Infection aiguë (G + M)

HSV 1 et 2 : Herpès simplex virus 1 et 2

- ☐ Statut immunitaire (G)

VZV : Varicelle-Zona Virus

- ☐ Statut immunitaire (G)

Pour plus de précisions, veuillez consulter le catalogue référentiel des examens de biologie médicale.

- tube sec avec gel séparateur (bouchon orange) (G) : recherche d'IgG
○ tube PPT avec gel séparateur (bouchon blanc nacré) (M) : recherche d'IgM
● tube EDTA (bouchon violet, bague noire) (G + M) : recherche d'IgG et d'IgM

Toute suspicion d'infection aiguë par HSV ou VZV doit mener à la prescription
d'une PCR, réalisable sur lésion cutanéomuqueuse, prélèvement oculaire,
LCR, LBA ou biopsie.

Réservé laboratoire

- ☐ Scan Ordo ☐ Tube surnuméraire ☐ Autre analyse ☐ Date/heure fausse ☐ mauvais conditionnement ☐ Case non/mal cochée ☐ Abs rens cliniques ☐ Mv bon
- ☐ Navette ☐ Envoi par labo ext. ☐ Disc. bon/ordo ☐ ☐ Protocole ☐

☒ Cocher impérativement dans la case
PAS DE FEUTRE

RESERVE AU
LABORATOIRE

Prélever 1 grand tube sec avec gel séparateur (7mL)
Quel que soit le nombre de sérologies prescrites



Renseignements cliniques :

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Dépistage systématique | ☐ Exposition récente +/- clinique évocatrice | ☐ Suivi de traitement |
| ☐ Endocardite | ☐ Pneumopathie | ☐ Prise de biotine |
| Signes neurologiques : ☐ aigus | ☐ chroniques | |
| Signes articulaires : ☐ aigus | ☐ chroniques | |

Bactériologie

Syphilis : ☐ sérologie Syphilis ☐ Syphilis sur LCR **Toujours associer à une**
Lyme : ☐ sérologie Lyme ☐ Lyme sur LCR **sérologie du même jour**

Autres sérologies bactériennes

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| ☐ Helicobacter pylori | ☐ Mycoplasma pneumoniae | ☐ Coxiella burnetii (Fièvre Q) | ☐ Leptospire | ☐ P. aeruginosa (mucoviscidose) |
| ☐ Chlamydia trachomatis | ☐ Chlamydia pneumoniae | ☐ Francisella tularensis (Tularémie) | ☐ Rickettsies (Fièvre boutonneuse) | ☐ Ac anti-Strepto A (ASLO/ASDOR) |
| ☐ Yersinia | ☐ Legionella | ☐ Bartonella (Maladie des griffes du chat) | ☐ Ehrlichia (Anaplasma) | |
| ☐ Campylobacter | ☐ Chlamydia psittaci | ☐ Brucella | ☐ Salmonella Typhi/Paratyphi | |

Evaluation d'une réponse immunitaire vaccinale

- | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| ☐ Pneumocoque | ☐ Diphtérie | ☐ Tétanos | ☐ Haemophilus influenzae b | ☐ Coqueluche |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|

Mycologie

- Aspergillus** ☐ Antigène (galactomannane) ☐ Anticorps (précipitines aspergillaires)
- B-D-glucane** ☐ Antigène
- Candida** ☐ Antigène (mannane) + Anticorps
- Cryptocoque** *Utiliser le bon de Mycologie/Parasitologie*
- Pneumopathie d'hypersensibilité**
☐ poumon de fermier ☐ poumon d'éleveur d'oiseaux ☐ poumon domestique ☐ autre, précisez :

Parasitologie

- Toxoplasmose** ☐ grossesse ☐ hors grossesse ☐ enfant < 2 ans ☐ Western Blot (mère + enfant)
☐ toxoplasmose oculaire (sérum + humeur aqueuse)
- Toxocarose (LMV)** ☐ sérologie ☐ toxocarose oculaire (sérum + humeur aqueuse)
- Autres sérologies parasitaires**
- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| ☐ Amibiase | ☐ Anguillulose | ☐ Ascariodose | ☐ Babésiose | ☐ Bilharziose (Schistosomose) |
| ☐ Cysticercose | ☐ Distomatose (Fasciolose) | ☐ Echinococcoses (alvéolaire et kystique) | ☐ Filariose | ☐ Leishmaniose |
| ☐ Paludisme | ☐ Trichinellose | ☐ Trypanosomose africaine (maladie du sommeil) | ☐ Trypanosomose américaine (maladie de Chagas) | |

Autre sérologie

☐